



TRÁNSITO DE INTESTINO DELGADO

El día del estudio deberás presentarte con 15 minutos de anticipación en la Recepción de Pacientes Ambulatorios ubicado en la Planta Baja del Edificio Tradicional (esq. Marcelo T. de Alvear y Larrea), con la orden médica, la credencial y la autorización por parte de tu Cobertura Médica (en caso de ser requerida).

La duración del turno es de 1 hora a partir de iniciado el mismo. Durante ese tiempo, permanecerás en el consultorio.

Requerimientos:

- Adquirir en cualquier farmacia: FOSFATO DE SODIO, solución oral por 45 ml. Cantidad: 2 (dos) envases.
- Si estas tomando medicamentos debes consultar a tu médico a fin de adaptar la medicación antes de iniciar la preparación.
- De tener estudios anteriores, traerlos.

Preparación para turnos por la mañana:

Día previo:

- 08:00 Hs. Desayuno habitual.
- 12:30 Hs. Almuerzo: caldo con arroz o fideos.
- 14:30Hs. Pollo al horno, carne asada o pescado (con puré o papas hervidas). Postre: flan o gelatina. Té o café.
- Bebidas: sin gas (por lo menos dos vasos).
- 16:00 Hs. Tomar un frasco de FOSFATO DE SODIO (oral) diluido en medio vaso de agua fría.
- Por lo menos tomar 3 (tres) vasos de agua fría hasta la cena.
- 20:30 Hs. Cena: caldos colados (con sal) y jugos colados (azucarados), bebidas sin gas, por lo menos dos vasos.
- 22:00 Hs. Tomar un frasco de FOSFATO DE SODIO (oral) en medio vaso de agua fría.

Día del estudio:

- Concurrir con 8 (ocho) horas de ayuno total.



Preparación para turnos por la tarde:

Día previo:

- 08:00 Hs. Desayuno habitual.
- 12:30 Hs. Almuerzo: caldo con arroz o fideos.
- 14:00 Hs. Pollo al horno, carne asada o pescado (con puré o papas hervidas). Postre: flan o gelatina. Te o café. Bebidas: sin gas (por lo menos dos vasos).
- 19:00 Hs. Tomar un frasco de FOSFATO DE SODIO (oral) diluido en medio vaso de agua fría.
- Por lo menos tomar 3 (tres) vasos de agua fría hasta la cena.
- 20:30 Hs. Cena: caldos colados (con sal) y jugos colados (azucarados), bebidas sin gas, por lo menos dos vasos.
- 22:00 Hs. Tomar un frasco de FOSFATO DE SODIO (oral) en medio vaso de agua fría.

Día del estudio:

- Concurrir con 10 (diez) horas de ayuno total.

Descripción:

El motivo del estudio es conocer la porción inferior de su aparato digestivo (Intestino Delgado).

Para efectuar el estudio es imprescindible que el tubo digestivo esté libre de todo contenido, para lograrlo es estrictamente necesario el cumplimiento de la preparación indicada anteriormente. Si quedan restos de materia fecal (por más pequeños que sean) pueden producir falsas imágenes, siendo necesario (a veces), repetir el estudio por mala preparación.

La medicación preparatoria te hará concurrir frecuentemente a evacuar su intestino. Esto es normal e indica el éxito de la preparación.

Información y precauciones en el uso de medios de contraste:

La inyección de contraste endovenoso puede presentar reacciones secundarias leves que consisten en: sensación de calor en todo el cuerpo, náuseas, urticaria, urticaria y aumento del ritmo cardíaco que desaparecen en pocos minutos y no requieren tratamiento.

En algunos casos la administración de sustancias de contraste por vía endovenosa puede provocar inflamación en el sitio de punción venosa las primeras 24 a 48 horas. En tal caso, deberás colocarte hielo y consultarnos por teléfono o concurrir a nuestro servicio.

Muy raramente pueden aparecer alteraciones en el ritmo cardíaco, caída de la presión arterial o dificultad respiratoria, que requieren un tratamiento y en algunos casos internación.

También han sido descriptas, aunque con frecuencia muy baja (0,0006%), reacciones con fallo cardiovascular severo.

Nuestro servicio dispone de personal entrenado y medios para enfrentar estas posibles situaciones.

Los mecanismos de estas reacciones son multifactoriales, aun no bien conocidos y son permanente motivo de investigación.

No existe ningún método de testificación que pueda predecir la posibilidad de ocurrencia de reacciones adversas, incluso el haberse efectuado anteriormente estudios contrastados sin inconvenientes, no garantiza que estos no puedan producirse en un siguiente examen.

Ciertas características fisicoquímicas de estas sustancias, en personas susceptibles, alérgicos, asmáticos, cardíacos, renales, hepáticos aumentan la probabilidad de aparición de los efectos adversos.

Para decidir el tipo de contraste a utilizar, efectuar una evaluación de tus antecedentes y aumentar tu seguridad, deberás completar el cuestionario que se encuentra en este documento.